

Vårdprogrammets kvalitetsindikatorer

Koloncancer

Effektmått

	Mått	Urval	Målnivå
A	Radikalt opererad enligt kirurg och patolog*	Resecerade, M0	≥ 90%
B	30-dagarsmortalitet, akut opererad	Resecerade	< 4%
C	30-dagarsmortalitet, elektivt opererad	Resecerade	< 1%
D	Relativ 3-årsöverlevnad, akut opererad	Resecerade, M0	≥ 80%
E	Relativ 3-årsöverlevnad, elektivt opererad	Resecerade, M0	≥ 95%
F	Lokalrecidiv inom 3 år*	Resecerade	< 5%
G	Peroperativ tarmperforation*	Elektivt resecerade	0%
H	Cirkumferentiell marginal (CRM), andel > 1.0 mm*	Resecerade, ej pT0	≥ 90%

Processmått

	Mått	Urval	Målnivå
I	Väntetid från diagnos till behandlingsstart, andel inom 5 veckor*	Elektivt op, cyt/strål/op	≥ 80%
J	Väntetid från operation till PAD-svar, andel inom 3 veckor*	Resecerade	≥ 80%
K	Väntetid från operation till start av adjuvant behandling, andel inom 8 veckor*	Resecerade, stadium I-III, remitt till onkklän	≥ 80%
L	Täckningsgrad, anmälan	Alla	100%
M	Komplett staging*	Opererade	≥ 90%
N	Preterapeutisk MDK*	Alla men ej end polyp o ej akut op	≥ 90%
O	Ackrediterad kolorektalkirurg och/eller specialist med kolorektal inriktning*	Resecerade	≥ 95%
P	Antal undersökta körtlar ≥ 12*	Resecerade	≥ 95%
Q	Postoperativ MDK*	Op eller end polyp, ej 30d mort	≥ 90%
R	Remitterad till onkologiklinik*	Resecerade, stad III och ≤ 75 år	≥ 80%
S	Inkluderad i kirurgiska eller onkologiska studier*	30d uppf eller onk formulär finns	≥ 30%
T	Täckningsgrad, 3- och 5-årsuppföljning	Op eller end polyp, ej 30d mort	100%

*) "Uppgift saknas" exkluderas.

Rektalcancer

Effektmått

	Mått	Urval	Målnivå
A	Radikalt opererad enligt kirurg och patolog*	Resecerade, M0	≥ 90%
B	30-dagarsmortalitet	Resecerade	< 1%
C	Relativ 3-årsöverlevnad	Resecerade, M0	≥ 95%
D	Lokalrecidiv inom 3 år, ej preop strål*	Resecerade, T1-T3, ej preop strål	< 5%
E	Lokalrecidiv inom 3 år, preop strål*	Resecerade, T1-T3, preop strål	< 5%
F	Peroperativ tarmperforation*	Resecerade	0%
G	Cirkumferentiell marginal (CRM), andel > 1.0 mm*	Resecerade, ej pT0	≥ 90%

Processmått

	Mått	Urval	Målnivå
H	Väntetid från diagnos till behandlingsstart, andel inom 5 veckor*	Cyt/strål/op	≥ 80%
I	Väntetid från operation till PAD-svar, andel inom 3 veckor*	Resecerade	≥ 80%
J	Väntetid från operation till start av adjuvant behandling, andel inom 8 veckor*	Resecerade, stadium I-III, remitt till onkklín	≥ 80%
K	Väntetid från preterapeutisk MDK till start av preop strålbeh, andel inom 3 veckor*	Preterapeutisk MDK och preop strålbeh	≥ 90%
L	Täckningsgrad, anmälan	Alla	100%
M	Komplett staging*	Opererade	≥ 90%
N	Preterapeutisk MDK*	Alla utom end polyp	≥ 90%
O	Ackrediterad kolorektalkirurg och/eller specialist med kolorektal inriktning*	Resecerade	≥ 95%
P	Antal undersökta körtlar ≥ 12*	Resecerade	≥ 95%
Q	Sköljning*	Op med främre res eller Hartmann	100%
R	Postoperativ MDK*	Op eller end polyp, ej 30d mort	≥ 90%
S	Inkluderad i kirurgiska eller onkologiska studier*	30d uppf eller onk formulär finns	≥ 30%
T	Täckningsgrad, 3- och 5-årsuppföljning	Op eller end polyp, ej 30d mort	100%

*) "Uppgift saknas" exkluderas.