

Cancer i njurbäckenet, urinledarna eller urinröret

Cancer i njurbäckenet och/eller urinledarna

Cancer i njurbäckenet och/eller urinledarna är ovanligt. Den är vanligast hos personer över 60 år men kan ibland förekomma tidigare.

Symtom

- Sjukdomen ger ofta inga symtom i ett tidigt stadium. Senare kan du ha dessa symtom:
- Du kan ha blod i urinen.
- Du kan ha en krampande smärta som strålar ut mot sidan av ryggen. Det orsakas av att urinledaren täpps till av antingen en tumör eller levrat blod.

Behandling

Den vanligaste behandlingen är operation där man tar bort njuren och urinledaren. Du klarar dig bra med bara en njure och urinledare.

I vissa fall får du cytostatika före operationen.

I enklare fall kan tumören ibland brännas bort. Det görs vid en mindre operation via urinröret.

Cancer i urinröret

Cancer i urinröret är den mest ovanliga cancerformen i urinvägarna.

Symtom

Sjukdomen ger ofta inga symtom i ett tidigt stadium. Senare kan du ha dessa symtom:

- Om tumören har växt kan du känna en knöl vid urinrörsöppningen.
- Du kan ha blod i urinen.
- Det kan göra ont när du kissar.

Behandling

Den vanligaste behandlingen är operation där tumören hyvlas bort om den är yttlig.

Om tumören har växt genom slemhinnan kan man behöva ta bort urinröret.

I vissa fall får du strålbehandling eller cytostatika.