

## Icke-muskelinvasiv urinblåsecancer

Det vanligaste är att urinblåsecancer bara finns i urinblåsans slemhinna eller i bindväven under slemhinnan. Det innebär att muskeln i urinblåsans vägg inte är påverkad, och diagnosen kallas därför icke-muskelinvasiv urinblåsecancer. 3 av 4 av de som får urinblåsecancer har icke-muskelinvasiv urinblåsecancer.

### Behandlingsförslag

Vilken eller vilka behandlingar som du rekommenderas utgår från riktlinjerna i det nationella vårdprogrammet. Ibland behöver man diskutera behandlingsförslaget med flera experter. Det görs på en multidisciplinär konferens, MDK.

Annat som kan påverka behandlingsförslaget är hur du mår och om du har andra sjukdomar och läkemedel. Vad du själv vill och behöver vägs också in.

Du diskuterar behandlingsförslaget med din läkare, och ni kommer överens om vilken behandling du ska få. Du har alltid rätt att tacka nej till behandling. Närstående har inte rätt att bestämma.

### Operationen TUR-B är den vanligaste behandlingen

Den vanligaste behandlingen vid icke-muskelinvasiv urinblåsecancer är en operation som kallas TUR-B. Ibland kombinerar man operationen med ett läkemedel som sprutas in i urinblåsan. Det kallas instillation.

Det är vanligt att man behöver göra om operationen, en så kallad ReTUR-B. Det kan bero på olika saker:

- Tumören kommer tillbaka.
- Man kunde inte ta bort allt på en gång vid första operationen. Det är vanligt vid stora eller flera tumörer.
- Man behöver säkerställa att all tumör är borta.
- Man behöver säkerställa diagnosen.

### Uppföljning

Behandlingen följer nationella riktlinjer och följs upp med regelbundna kontroller och besök hos en läkare eller kontaktsjuksköterska. Utifrån kontrollerna planeras behandlingen vidare och du kan behöva byta behandling.

► Läs mer på [1177.se](https://1177.se). Sök på Urinblåsecancer.