

Spridd urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar

Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar kan sprida sig genom lymfsystemet vidare till andra lymfkörtlar. Cancern kan också sprida sig genom att växa direkt in i andra organ eller genom blodet och bilda metastaser i andra delar av kroppen, till exempel lungorna, levern eller skelettet.

När cancern har spridit sig kan du få behandling för att bromsa sjukdomen och lindra besvär av den. Bromsande och symtomlindrande behandling har ofta god effekt på hur du mår. Behandlingen kan pågå så länge som den har önskad effekt.

Behandlingsförslag

Efter utredningen tar vården fram ett behandlingsförslag utifrån sjukdomens egenskaper, dina förutsättningar och nationella riktlinjer. Vilken eller vilka behandlingar som rekommenderas för just dig diskuteras på en multidisciplinär konferens, MDK.

Tumörer har olika egenskaper som till exempel påverkar hur snabbt de växer och vilken typ av behandling de är känsliga för. Annat som kan påverka behandlingsförslaget är hur du mår och om du har andra sjukdomar och läkemedel. Vad du själv vill och behöver vägs också in.

Den vanligaste behandlingen vid spridd cancer är cytostatika. Det kan även bli aktuellt med strålbehandling eller läkemedel som aktiverar kroppens eget immunförsvar, så kallad immunterapi.

Du diskuterar behandlingsförslaget med din läkare, och ni kommer överens om vilken behandling du ska få. Du har alltid rätt att tacka nej till behandling. Närstående har inte rätt att bestämma.

Uppföljning

Uppföljningen följer nationella riktlinjer och består av regelbundna kontroller och besök hos en läkare eller kontaktsjuksköterska. Utifrån kontrollerna planeras behandlingen vidare och du kan behöva byta behandling.

► Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på Urinblåsecancer.