

Instillationsbehandling för cancer in situ i övre urinvägarna

Instillationsbehandling används ibland för en viss typ av yttlig cancer i övre urinvägarna som kallas cancer in situ. Behandlingen innebär att man sprutar in läkemedel i urinblåsan via en kateter eller stent till övre urinvägarna.

Det kan bli aktuellt om

- du har nedsatt njurfunktion
- din ålder och andra sjukdomar gör att du bör undvika en större operation på grund av ökad risk för komplikationer.

Om du tar läkemedel som hämmar immunförsvaret eller har tuberkulos är behandlingen inte lämplig.

Instillationen kan ges på tre sätt

Du får instillationen på något av dessa tre sätt:

- Genom en nefrostomi, en tunn kateter som sätts in genom huden till njurbäckenet.
- Genom en ureterkateter, en tunn kateter som går in via urinröret, genom urinblåsan upp till njurbäckenet.
- Genom en urinkateter via en stent. Stenten är en tunn kateter som sätts in mellan urinblåsan och njurbäckenet. Du kommer ligga med sängens huvudända tippad neråt. Det är för att läkemedlet ska nå de övre urinvägarna.

Din läkare väljer vad som blir lämpligast för dig.

Hur ska jag förbereda mig?

Nefrostomin, ureterkatetern eller stenten sätts in med lokalbedövning vid ett förberedande besök innan behandlingen startar.

Du behöver också lämna urinprov innan behandlingen börjar.

Så går det till

1 gång i veckan i 6 veckor får du komma till din kontaktsjuksköterska som ger instillationen som dropp in i nefrostomin, ureterkatetern eller in i urinblåsan genom en urinkateter om du har fått en stent.

Innan behandlingen börjar får du en dos förebyggande antibiotika.

Efteråt stannar du ett par timmar på sjukhuset för observation innan du går hem.

Hur mår jag efteråt?

När behandlingsserien är avslutad tar man ut nefrostomin eller stenten. Det är ett litet ingrepp med lokalbedövning och du kan gå hem efteråt.