

Svenska barncancerregistret – SALUB

Rekommendation – formulär

Version 20211227

Rapporteringsdatum:
2 0
Rapporterad av:
Rapporterat klink:
Förnamn:
Efternamn:
Födelsedatum:
2 0 -
Kön:
☐ Kvinna ☐ Man
Adress:
Stad:
Land:
Datum för uppföljningsrekommendationer:
2 0

Organsystem

Organfunktioner för screening/uppföljning (Flera alternativ)

- ☐ Metabol funktion
- ☐ Endokrinologi
- ☐ Fertilitet
- ☐ Sexuell funktion
- ☐ Hjärta
- ☐ Lungor
- ☐ Njurar
- ☐ Urinblåsa
- ☐ Hörsel
- ☐ Syn
- ☐ Neuropsykologisk funktion
- ☐ Skelett/mjukdelar
- ☐ Mun/svalg/tänder
- ☐ Blod/benmärg/immunsystem
- ☐ Sekundär malignitet

Metabol funktion

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Metabol funktion – risk

- ☐ Måttlig ☐ Hög
- ☐ Strålbehandling mot buken
- ☐ Midjemått > 95:e percentilen
- ☐ Helkroppsbestrålning
- ☐ BMI > obesitas-gräns

Rekommendationstext

Rekommendationstext metabol funktion:

☐ Exkludera autotext metabol funktion

Rekommendationstext metabol funktion – fritext

Endokrinologi

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Endokrinologi – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Stråldos mot hypofys/hypothalamus eller helkroppsbestrålning

☐ Stråldos med thyroidea

Rekommendationstext

Rekommendationstext endokrinologi funktion:

☐ Exkludera autotext endokrinologi

Rekommendationstext endokrinologi – fritext

Fertilitet

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Fertilitet – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Alkylerande cytostatika, medelhöga till låga doser

☐ Alkylerande cytostatika, höga doser

☐ Cytostatikabehandling utan alkylerare eller strålbehandling mot testiklar

☐ Strålbehandling mot CNS > 30 Gy

☐ Stråldos mot testiklar

Rekommendationstext

Rekommendationstext fertilitet 1:

☐ Exkludera autotext fertilitet

Rekommendationstext fertilitet – fritext

Sexuell funktion

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Sexuell funktion– risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Strålbehandling mot lilla bäckenet/könsorgan

☐ Spinal skada

Rekommendationstext

Rekommendationstext sexuell funktion:

☐ Exkludera autotext sexuell funktion

Rekommendationstext sexuell funktion – fritext

Hjärta

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Hjärta – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Doxorubicinekvivalent dos > 250 mg/m²

☐ Doxorubicinekvivalent dos < 250 mg/m²

☐ Stråldos mot hjärtat > 20 Gy eller helkroppsbestrålning

☐ Antracyclinbehandling och stråldos mot hjärtat > 20 Gy eller helkroppsbestrålning

Rekommendationstext

Rekommendationstext hjärta 1:

☐ Exkludera autotext hjärta

Rekommendationstext hjärta – fritext

Lungor

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Lungor – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Metastaskirurgi lunga

☐ Busulfan, CCNU, BCNU

☐ Strålbehandling mot thorax eller helkroppsbestrålning

☐ Bleomycin

Rekommendationstext

Rekommendationstext lungor:

☐ Exkludera autotext lungor

Rekommendationstext lungor – fritext

Njurar

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Njurar – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Carboplatin, ifosfamid < 60 g/m², inget cisplatin eller melfalan. Ingen strålbehandling eller TBI.

☐ Cisplatin, Ifosfamid > 60 g/m², Melfalan

☐ Stråldos njurar bilateralt > 14 Gy eller > 14 Gy mot en kvarvarande njure

☐ Stråldos unilateralt > 25 Gy (och kvarvarande njure)

☐ TBI

Rekommendationstext

Rekommendationstext njurar:

☐ Exkludera autotext lungor

Rekommendationstext njurar – fritext

Urinblåsa

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Urinblåsa – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Urinblåsetoxisk behandling eller spinal påverkan

Rekommendationstext

Rekommendationstext urinblåsa:

☐ Exkludera autotext urinblåsa

Rekommendationstext urinblåsa – fritext

Hörsel

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Hörsel – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Cisplatin, Carboplatin eller stråldos mot innerörat eller TBI

Rekommendationstext

Rekommendationstext hörsel:

☐ Exkludera autotext hörsel

Rekommendationstext hörsel – fritext

Syn

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Syn – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Strålbehandling som nått ögats lins eller TBI

Rekommendationstext

Rekommendationstext syn:

☐ Exkludera autotext syn

Rekommendationstext syn – fritext

Neuropsykologisk funktion

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Neuropsykologisk funktion – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Strålbehandling mot CNS eller TBI

☐ Neurotoxisk cytostatikabehandling

☐ ALL-behandling

Rekommendationstext

Rekommendationstext Neuropsykologisk funktion:

☐ Exkludera autotext Neuropsykologisk funktion

Rekommendationstext Neuropsykologisk funktion – fritext

Skelett/mjukdelar

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Skelett/mjukdelar – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Glukokortikoidbehandling i högdos

☐ Stråldos mot muskulatur/skelett eller TBI

Rekommendationstext

Rekommendationstext skelett och mjukdelar:

☐ Exkludera autotext skelett och mjukdelar

Rekommendationstext skelett och mjukdelar – fritext

Mun/Svalg/Tänder

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Mun/svalg/tänder – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Cytostatika

☐ Stråldos mot munhåla/spottkörtlar

Rekommendationstext

Rekommendationstext mun/svalg/tänder:

☐ Exkludera autotext mun/svalg/tänder

Rekommendationstext mun/svalg/tänder – fritext

Blod/benmärg/immunsystem

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Blod/benmärg/immunsystem – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Oklart vaccinationsstatus

☐ Otillräckligt vaccinationsstatus

Rekommendationstext

Rekommendationstext blod/benmärg/immunsystem:

☐ Exkludera autotext blod/benmärg/immunsystem

Rekommendationstext blod/benmärg/immunsystem – fritext

Sekundär malignitet

Fylls endast i om den är inkluderat i organfunktioner för screening/uppföljning

Sekundär malignitet – risk

☐ Måttlig ☐ Hög

☐ Stråldos > 10 Gy mot bröstkörtlar inkl TBI

☐ Strålbehandling (utom TBI)

☐ Allogen SCT, organtransplantation, TBI, pågående immunsuppressiv behandling, kronisk hud-GvHD

☐ Strålbehandling mot hals, övre delen av thorax, skallbas där thyroidea nåtts av < 2 Gy, TBI

Rekommendationstext

Rekommendationstext sekundär malignitet:

Svenska barncancerregistret – SALUB

Rekommendation – formulär

Version 20211227

☐ Exkludera autotext sekundär malignitet

Rekommendationstext sekundär malignitet – fritext:
