

INSTRUKTIONER för rapportering av formulär Kemoterapi

Behandlingsindikation	- Neoadjuvant - före operation - Adjuvant - efter operation - Palliativt – symtomlindrande, ej botbar behandling - Biverkningar av föregående behandling - Recidiv - återfall i sjukdom - Bristande effekt av tidigare given behandling		
ECOG/ WHO performance status	Behandlande läkare gör bedömning av patientens förmåga		
PIC	Paclitaxel, Ifosfamid, Cisplatin.		
PICarbo	Paclitaxel, Ifosfamid, Carboplatin		
Gradering av toxicitet enligt WHO 1979: <i>Gäller endast vid grad 3 eller 4 biverkningar</i> <i>* UNL= övre normalgränsen</i>	Toxicitet: Kreatinin: Hb: Lpk: Tpk:	Grad:3 5-10 x UNL* 65-79g/L 1,01,9(109/L) 25-49(109/L)	Grad:4 >10 x UNL* < 65g/L < 1,0(109/L) < 25 (109/L)
Allvarlig infektion <i>Gäller endast vid grad 3 eller 4 biverkningar</i>		Svår infektion som kräver antibiotika	Livshotande infektion med blodtrycks-påverkan
Mätbar sjukdom	Mätbar sjukdom om det finns lesioner som är över 1 cm		
Bästa tumörrespons	Grundar sig på den samlade kliniska bedömningen - CR=komplett respons fullständigt försvinnande av samtliga tumörmanifestationer på CT-PET-CT eller MR. - PR=partiell respons reduktion av mätbar tumör med $\geq 50\%$ utan samtidig progress på andra lesioner ($\geq 50\%$ reduktion av produkten av de största perpendikulära diametrarna) - SD=stabil sjukdom effekt av behandling uppfyller inte kriterier för partiell remission och inte heller för progressiv sjukdom. - PD=progressiv sjukdom ökning av tumörmanifestationer skall vara $\geq 25\%$, eller tillkomst av nya tumörmanifestationer - Kan inte bedömas		